

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

| VACUNA | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | DOSIS | EDAD Y FRECUENCIA | FECHA DE VACUNACIÓN |
|---|---|----------|-------------------|---------------------|
| B C G | TUBERCULOSIS | ÚNICA | AL NACER | |
| HEPATITIS B | HEPATITIS B | PRIMERA | AL NACER | |
| | | SEGUNDA | 2 MESES | |
| | | TERCERA | 6 MESES | |
| PENTAVALENTE ACELULAR DPaT + VPI + Hib | DIFTERIA, TOS FERINA, TÉTANOS, POLIOMIELITIS E INFECCIONES POR <i>H. influenzae b</i> | PRIMERA | 2 MESES | |
| | | SEGUNDA | 4 MESES | |
| | | TERCERA | 6 MESES | |
| | | CUARTA | 18 MESES | |
| DPT | DIFTERIA, TOS FERINA Y TÉTANOS | REFUERZO | 4 AÑOS | |
| ROTAVIRUS | DIARREA POR ROTAVIRUS | PRIMERA | 2 MESES | |
| | | SEGUNDA | 4 MESES | |
| | | TERCERA | 6 MESES | |

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

| VACUNA | ENFERMEDAD QUE PREVIENE | DOSIS | EDAD Y FRECUENCIA | FECHA DE VACUNACIÓN | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|--|--|--|
| NEUMOCÓCICA CONJUGADA | INFECCIONES POR NEUMOCOCO | PRIMERA | 2 MESES | | | | |
| | | SEGUNDA | 4 MESES | | | | |
| | | REFUERZO | 12 MESES | | | | |
| INFLUENZA | INFLUENZA | PRIMERA | 6 MESES | | | | |
| | | SEGUNDA | 7 MESES | | | | |
| | | REVACUNACIÓN | ANUAL HASTA LOS 59 MESES | | | | |
| SRP | SARAMPIÓN, RUBÉOLA Y PAROTIDITIS | PRIMERA | 1 AÑO | | | | |
| | | REFUERZO | 6 AÑOS | | | | |
| SABIN | POLIOMIELITIS | | ADICIONALES | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| SR | SARAMPIÓN Y RUBÉOLA | | ADICIONALES | | | | |
| OTRAS VACUNAS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |